

Tips voor de vleesvarkenshouderij



Op vele bedrijven wordt de technische boekhouding van de zeugenhoudery op de voet opgevolgd. Bij biggen en vleesvarkens gebeurt dit helaas vaak minder strikt. Ongeveer 75% van het inkomen op een gesloten varkensbedrijf komt echter uit de vleesvarkens. Volgende tips kunnen je helpen om de technische resultaten op je bedrijf te optimaliseren.

TOON ELSSEN

COMMERCIEEL VERANTWOORDELIJKE VARKENS

1. Meten is weten

Wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn over je vleesvarkens, is het moeilijk om de minpunten van je bedrijf te achterhalen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Denk maar aan onze Saldomanager of de boekhouding in Ceres.

In onderstaande tabel vind je de impact van de verschillende technische parameters terug. Kleine verschillen kunnen veel geld opbrengen.

Parameter	Extra opbrengst per vleesvarken (vanaf 20kg)
100 gram dalen in VC	€ 2,5
50 gram groei/dag extra	€ 1,0
1 % sterfte	€ 0,5
Slachtkwaliteit : 1% vlees	€ 0,8
MBI 0,1 verbeteren	€ 0,9

Als voorbeeld nemen we een bedrijf van 300 zeugen en afmesten, een productiegetal van 30 biggen per zeug per jaar en 3% uitval vanaf spenen. De voederconversie met 0,05 punten verbeteren betekent hier een opbrengst van bijna 11.000 euro per jaar!

2. De technische resultaten zijn vooral afhankelijk van 6 belangrijke factoren

a. Diergezondheid

Controleer dagelijks het welzijn van de varkens en reageer accuraat. Let er vooral op dat de dieren dagelijks goed gevuld staan. Jaag de dieren recht en scheid achterblijvers indien nodig van de andere varkens.

Ontwormen van vleesvarkens gebeurt vaak nog te weinig consequent. Ontworm om de 5 weken. De gevolgen van een slecht beleid zijn op het eerste zicht niet direct zichtbaar, maar kunnen snel grote proporties aannemen. De kostprijs per varken om te ontwormen (3

keer) bedraagt 0,6 €. Wanneer er 10 % afgekeurde levers vastgesteld zijn, kost je dat 0,77 € per varken. Wanneer er 40 % afgekeurde levers zijn vastgesteld, kost je dat al snel 4,4 € per varken.

In ons voorbeeldbedrijf van 300 zeugen betekent 10% afgekeurde levers gemiddeld een verlies van 6.700 € per jaar.

b. Voeder

Het juiste voeder voor het juiste varken. In het AVEVE Crescendo vleesvarkensgamma hebben wij voor elk dier het geschikte product. Koppel regelmatig terug met je commercieel verantwoordelijke.

c. Water

Controleer dagelijks of de varkens voldoende en kwalitatief water krijgen. Gebruik de juiste drinknippels op de juiste hoogte in functie van het gewicht van de varkens.

Het debiet van de drinknippels moet tussen de 0,8 en 1 l/min. liggen. Varkens tussen de 20 en 50 kg hebben een behoefte aan 2,5 tot 5 liter water per dag. Varkens tussen de 50 en 110 kg hebben een behoefte van 5 tot 10 liter per dag. Een gulden regel is dat de water/voerverhouding minimaal 2 moet zijn. Indien dit niet gehaald wordt, zal de voeropname aanzienlijk lager liggen.

Controleer minimaal jaarlijks het drinkwater. Laat dit zowel bacteriologisch als chemisch analyseren. Neem je stalen altijd op het einde van de leiding!

d. Een goede start

Start met een zo gezond mogelijke big. Laat deze big bij opzet in de voormest- of vleesvarkensstal aankomen in een droge stal die gereinigd, ontsmet en verwarmd is.



e. Genetica

Beoordeel je eigen bedrijf en niet dat van je buurman. Elk bedrijf zit immers met andere genetica. Laat je daarom begeleiden door je commercieel verantwoordelijke voor het hanteren van de juiste voederschema's. Wees kritisch voor jezelf en probeer de positieve en negatieve eigenschappen van de genetica op je bedrijf tegen elkaar af te wegen.

f. Management

- Geef vleesvarkens voldoende ruimte om te groeien. Hoe groter de groep, hoe lager de voederopname. Wettelijk gezien moeten vleesvarkens minimaal over 0,65 m³/100 kg beschikken. Voor een optimaal technisch resultaat (per stalplaats per jaar) reken je best op volgende ideale bezetting:

Gemiddeld diergewicht	Vereiste oppervlakte/dier (m ²)	AVEVE advies
10-20 kg	0,15	0,30
20-30 kg	0,20	0,30
30-50 kg	0,40	0,65
50-85 kg	0,55	0,65
85-110 kg	0,65	0,75
>110kg	1,00	1,00

Normen per vreetplaats

Zeker kort na het spenen zijn de beschikbare eet- en drinkplaatsen van groot belang. De eerste 14 dagen na het spenen voorzie je best per 10 biggen een extra ronde bak. Verder kan je best de aantallen in onderstaande tabel aanhouden:

	Aantal varkens	Aantal cm
Droogvoerbak		
Biggen	6 tot 7	25cm
Vleesvarkens	6 tot 7	40 cm
1-vaks brijbak	maximaal 12	

Vaak worden varkens bij opzet dikker gezet en later uitgesplitst in twee groepen. Let hierbij op dat je voldoende drinkknippels voorziet. Liefst 1 drinknippel per 10 varkens.

In de praktijk zien we vaak dat de wettelijke minimale normen niet voldoende zijn voor de hoogst mogelijke rendabiliteit.

- **Stalklimaat**
Analyseer ieder seizoen je stalklimaat. De eerste koude nachten zijn een feit en de eerste App-gevallen (eenzijdige longontsteking) duiken op. Controleer de temperatuur. Streef naar een opzettertemperatuur van 24°C. Pas de bandbreedte eventueel aan in de winter. Bij aanhoudende problemen raadpleeg je best een klimaatspecialist of je commercieel verantwoordelijke.
- Streef naar all-in all-out stallen.
- Voorkom voervermorsing en gebruik de juiste voedervorm voor de juiste voerbak (meelcrunch-korrel).